

**ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
КАННАБИНОИДОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ИЗМЕНЕНИЮ СПОРТИВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ:**

- снижению работоспособности;
- ухудшению координации;
- потере мотивации;
- снижению качества выполнения двигательных задач;
- увеличению времени восстановления после тренировки;
- снижению выносливости и быстрой утомляемости;
- частой смене настроения от эйфории к депрессии.

Национальная антидопинговая лаборатория всегда информирует Национальное антидопинговое агентство об обнаружении любого количества каннабиноидов, а Дисциплинарная антидопинговая комиссия применяет к спортсмену дисциплинарное наказание за нарушение спортивного режима и направляет сведения в Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ МВД Республики Беларусь.



Жить честным спортом!


г. Минск, ул. Игнатенко, 13,
каб.: 206-208, 215
тел.: (017) 226-69-86; (017) 226-71-75
тел/факс (017) 226-74-58
e-mail: nadabelarus@tut.by
сайт: www.nada.by



НАЦИОНАЛЬНОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
www.nada.by

**КАННАБИНОИДЫ:
ВЛИЯНИЕ,
ПОСЛЕДСТВИЯ,
ЗАВИСИМОСТЬ.**

ЗАДУМАЙСЯ...



МИНСК 2013

Каннабиноиды (каннабис) —

наркотические вещества:

марихуана, гашиш, конопля -
входят в "Список запрещённых
веществ и методов" Всемирно-
го антидопингового агентства
(класс S8) и запрещены в сорев-
новательный период

Употребление
каннабиса
провоцирует
развитие
психотических
расстройств !!!



ВНИМАНИЕ!

**Каннабиноиды обнаруживаются
в организме в течение
длительного периода времени
даже после однократного
употребления!**



Последствия употребления каннабиноидов для различных систем организма.

ЦНС: Каннабиноиды влияют на кон-
центрацию внимания, мыслительные
способности, способность к понима-
нию, обучению. Может вызывать
состояние паники, беспокойство,
токсические психозы.

Лёгкие: Употребление каннабинои-
дов вызывает все вредные эффекты,
свойственные табакокурению: бронхи-
ты, фарингиты, синуситы, рак легких.
Марихуана в большей степени, чем та-
бак, способствует развитию заболева-
ний верхних дыхательных путей.

Сердце: Употребление каннабинои-
дов вызывает усиленное сердцебиение,
учащение пульса и повышение кровя-
ного давления. Курение марихуаны
особенно опасно для людей, страдаю-
щих сердечными недугами.

Половая система (мужчины):

Употребление каннабиноидов снижа-
ет содержание тестостерона, основного
мужского гормона. Продолжительное
применение изменяет гормональный
фон настолько, что в тяжелых случа-
ях, наблюдается уменьшение числа
сперматозоидов и их подвижности и
увеличение числа аномальных клеток
в сперме.

Половая система (женщины):

Каннабиноиды накапливаются в жен-
ских репродуктивных органах, оказы-
вают токсическое действие на развитие
плода, вызывая отклонения при вына-
шивании, тяжелое протекание родов.
Вместе с молоком матери каннабинои-
ды переходят в детский организм при
кормлении.

Токсические проявления употребления каннабиноидов:

- мышечные судороги;
- беспокойство;
- подозрительность;
- бред;
- паранойя;
- паническое состояние;
- нарушение мозгового
кровообращения;
- затруднённая речь.